

## CDDP+S-1療法

## 【レジメン】

day1~21 • S-1 40-60mg/回、2回/day

day8 ⒸCDDP 60mg/m<sup>2</sup>

day22~35 休薬

上記を5週毎に繰り返す。

## S-1の初回基準量について

体表面積	1回用量	1日用量
1.25m <sup>2</sup> 未満	40mg	80mg/day
1.25m <sup>2</sup> 以上~1.5m <sup>2</sup> 未満	50mg	100mg/day
1.5m <sup>2</sup> 以上	60mg	120mg/day

## 【治療内容】

実施日	投与薬剤	経路	投薬内容	時間
day1 ( / )	S-1内服開始、本日夕より21日間継続。			
day8 ( / )	<input type="checkbox"/> ① イメンド125mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。 Ⓒ開始60-90分前に内服。	
	<input type="checkbox"/> ② 生食500mL	点滴	腎障害予防の点滴です。	60分
	<input type="checkbox"/> ③ デキサート12mg+ アロキシバク50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ④ ソリタT3 500mL+ 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL	点滴	腎障害予防の点滴です。	60分
	<input type="checkbox"/> ⑤ 20%マンニトール 300mL	点滴	利尿剤です。	30分
	<input type="checkbox"/> ⑥ CDDP ( ) mg+ 生食250mL	点滴	治療薬です。	120分
	<input type="checkbox"/> ⑦ ソリタT3 1000mL	点滴	腎障害予防の点滴です。	120分
	<input type="checkbox"/> ⑧ フロセミド20mg 1A	静注	利尿剤です。	
day9 ( / )	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ② デカドロン0.5mg 8錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ③ デカドロン0.5mg 8錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	夕食後
day10 ( / )	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ② デカドロン0.5mg 8錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ③ デカドロン0.5mg 8錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	夕食後
day11 ( / )	<input type="checkbox"/> ① デカドロン0.5mg 8錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ② デカドロン0.5mg 8錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	夕食後
day22 ( / )	本今朝にてS-1内服終了、2週間休薬すること。			
day36 ( / )	次コース開始。			

## 【化学療法施行前に処方する薬剤】

- イメンドセット 1セット
- デカドロン錠0.5mg 16錠/2x朝・夕食後 3日

## 【化学療法に関わる指示】

嘔気時：メトクロプラミド ( ) A 静注およびデキサート ( ) mg 静注 ※配合変化のため混合しない  
上記効果が不十分な場合

オランザピンOD錠5mg 1錠内服 (1日1回のみ使用可) ※糖尿病の既往がある場合は使用不可

吃逆時：メトクロプラミド1A静注

コントミン10mg 1A 筋注

※メトクロプラミド (注射・錠剤) とH2ブロッカー (注射) またはPPI (注射) は原則併用禁忌です。