

## XELOX療法

## 【レジメン】

day 1 ③オキサリプラチン 130mg/m<sup>2</sup>  
 day 1~14 ゼロダ(300) 1000mg/m<sup>2</sup>/回  
 1日2回 朝・夕食後  
 day 15~21 休薬  
 上記を3週毎に繰り返す。

## ゼロダの投与量について

体表面積	1回用量	1日用量
<1.36m <sup>2</sup>	1200mg	2400mg/day
1.36~1.66m <sup>2</sup>	1500mg	3000mg/day
1.66~1.96m <sup>2</sup>	1800mg	3600mg/day
1.96m <sup>2</sup> ≦	2100mg	4200mg/day

## 【治療内容】

実施日	投与薬剤	経路	投薬内容	時間
day1 ( / )	<input type="checkbox"/> ① イメンド125mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。 ③開始60-90分前に内服。	
	<input type="checkbox"/> ② デキサート6mg+ アロキシバッグ50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ③ オキサリプラチン ( ) mg+ 5%ブドウ糖液250mL	点滴	治療薬です。	120分
	<input type="checkbox"/> ④ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
ゼロダ内服開始、本日から14日間継続。				
day2 ( / )	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
day3 ( / )	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
day15 ( / )	本日朝にてゼロダ内服終了、1週間休薬すること。			
day22 ( / )	次コース開始。			

## 【化学療法施行前に処方する薬剤】

- ・イメンドセット 1セット  
 (外来の場合：イメンド125mg 1Cは治療当日に汎用で、イメンド80mg 2Cは院外処方箋で対応)

## 【化学療法に関わる指示】

嘔気時：メトクロプラミド ( ) A 静注およびデキサート ( ) mg 静注 ※配合変化のため混合しない  
 上記効果が不十分な場合  
オランザピンOD錠5mg 1錠内服 (1日1回のみ使用可) ※糖尿病の既往がある場合は使用不可  
 吃逆時：メトクロプラミド1A静注  
コントミン10mg 1A 筋注  
※メトクロプラミド (注射・錠剤) とH2ブロッカー (注射) またはPPI (注射) は原則併用禁忌です。