

XP療法

【レジメン】

day 1~14 ゼローダ(300) 1000mg/m²/回
 1日2回 朝・夕食後

day 1 ⑥ CDDP 80mg/m²

day 15~21 休薬
 上記を3週毎に繰り返す。

ゼローダの投与量について

体表面積	1回用量	1日用量
<1.36m ²	1200mg	2400mg/day
1.36~1.66m ²	1500mg	3000mg/day
1.66~1.96m ²	1800mg	3600mg/day
1.96m ² ≦	2100mg	4200mg/day

【治療内容】

実施日	投与薬剤	経路	投薬内容	時間
day1 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド125mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。 ⑥開始60-90分前に内服。	
	<input type="checkbox"/> ② 生食500mL	点滴	腎障害予防の点滴です。	60分
	<input type="checkbox"/> ③ デキサート12mg+ アロキシバッグ50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ④ ソリタT3 500mL+ 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL	点滴	腎障害予防の点滴です。	60分
	<input type="checkbox"/> ⑤ 20%マンニトール 300mL	点滴	利尿剤です。	30分
	<input type="checkbox"/> ⑥ CDDP () mg+ 生食250mL	点滴	治療薬です。	120分
	<input type="checkbox"/> ⑦ ソリタT3 1000mL	点滴	腎障害予防の点滴です。	120分
	<input type="checkbox"/> ⑧ フロセミド20mg 1A	静注	利尿剤です。	
ゼローダ内服開始、本日夕より14日間継続。				
day2 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ② デカドロン0.5mg 8錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ③ デカドロン0.5mg 8錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	夕食後
day3 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ② デカドロン0.5mg 8錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ③ デカドロン0.5mg 8錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	夕食後
day4 (/)	<input type="checkbox"/> ① デカドロン0.5mg 8錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ② デカドロン0.5mg 8錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	夕食後
day15 (/)	本日朝分内服にてゼローダ終了、1週間休薬すること。			
day22 (/)	次コース開始。			

【化学療法施行前に処方する薬剤】

- ・イメンドセット 1セット
- ・デカドロン錠0.5mg 16錠/2x朝・夕食後 3日

【化学療法に関わる指示】

嘔気時：メトクロプラミド () A 静注およびデキサート () mg 静注 ※配合変化のため混合しない
 上記効果が不十分な場合
オランザピンOD錠5mg 1錠内服（1日1回のみ使用可）※糖尿病の既往がある場合は使用不可

吃逆時：メトクロプラミド1A静注
コントミン10mg 1A 筋注

※メトクロプラミド（注射・錠剤）とH2ブロッカー（注射）またはPPI（注射）は原則併用禁忌です。