

## 【レジメン】

day 1,8,15 パクリタキセル 80mg/m<sup>2</sup>

day 1,15 サイラムザ 8mg/kg

上記を4週毎に繰り返す。

## 【治療内容】

| 実施日            | 投与薬剤   | 経路 | 投薬内容                     | 時間   |
|----------------|--|----|--------------------------|------|
| day1<br>( / )  | <input type="checkbox"/> ① ポラミン注5mg+<br>ラニチジン注50mg+生食50mL  | 点滴 | 過敏症予防の点滴です。              | 15分  |
|                | <input type="checkbox"/> ② デキサート12mg+<br>アロキシバック50mL       | 点滴 | 吐き気予防の点滴です。              | 30分  |
|                | <input type="checkbox"/> ③ サイラムザ ( ) mg+<br>生食250mL        | 点滴 | 治療薬です。<br>*フィルター付輸液セット使用 | 60分  |
|                | <input type="checkbox"/> ④ 生食50mL                          | 点滴 | ルート内をフラッシュします。           | 15分  |
|                | <input type="checkbox"/> ⑤ ※ 観 察 時 間                       |    |                          | 45分  |
|                | <input type="checkbox"/> ⑥ パクリタキセル ( ) mg+<br>5%ブドウ糖液250mL | 点滴 | 治療薬です。<br>*フィルター付輸液セット使用 | *60分 |
|                | <input type="checkbox"/> ⑦ 生食50mL                          | 点滴 | ルート内をフラッシュします。           | 15分  |
| day8<br>( / )  | <input type="checkbox"/> ① ポラミン注5mg+<br>ラニチジン注50mg+生食50mL  | 点滴 | 過敏症予防の点滴です。              | 15分  |
|                | <input type="checkbox"/> ② デキサート8mg+<br>グラニセトンバッグ1mg/50mL  | 点滴 | 吐き気予防の点滴です。              | 30分  |
|                | <input type="checkbox"/> ③ パクリタキセル ( ) mg+<br>5%ブドウ糖液250mL | 点滴 | 治療薬です。<br>*フィルター付輸液セット使用 | *60分 |
|                | <input type="checkbox"/> ④ 生食50mL                          | 点滴 | ルート内をフラッシュします。           | 15分  |
| day15<br>( / ) | <input type="checkbox"/> ① ポラミン注5mg+<br>ラニチジン注50mg+生食50mL  | 点滴 | 過敏症予防の点滴です。              | 15分  |
|                | <input type="checkbox"/> ② デキサート12mg+<br>アロキシバック50mL       | 点滴 | 吐き気予防の点滴です。              | 30分  |
|                | <input type="checkbox"/> ③ サイラムザ ( ) mg+<br>生食250mL        | 点滴 | 治療薬です。<br>*フィルター付輸液セット使用 | 60分  |
|                | <input type="checkbox"/> ④ 生食50mL                          | 点滴 | ルート内をフラッシュします。           | 15分  |
|                | <input type="checkbox"/> ⑤ ※ 観 察 時 間                       |    |                          | 45分  |
|                | <input type="checkbox"/> ⑥ パクリタキセル ( ) mg+<br>5%ブドウ糖液250mL | 点滴 | 治療薬です。<br>*フィルター付輸液セット使用 | *60分 |
|                | <input type="checkbox"/> ⑦ 生食50mL                          | 点滴 | ルート内をフラッシュします。           | 15分  |
| day22          | 休薬   |    |                          |      |

※観察時間：Infusion reactionの発現確認のため、最初の2サイクルは必ずサイラムザ投与後1時間、観察時間を設けること。Infusion reactionの発現がなければ、3サイクル以降は省略可能。

※パクリタキセルを含む輸液は流量速度が低下するため、滴数を増加する必要があります。

## 【化学療法に関わる指示】

嘔気時：メトクロプラミド ( ) A 静注およびデキサート ( ) mg 静注 ※配合変化のため混合しない  
上記効果が不十分な場合

オランザピンOD錠5mg 1錠内服（1日1回のみ使用可）※糖尿病の既往がある場合は使用不可

吃逆時：メトクロプラミド1A静注

コントミン10mg 1A 筋注

※メトクロプラミド（注射・錠剤）とH2ブロッカー（注射）またはPPI（注射）は原則併用禁忌です。