

アクプラ+5-FU療法

【レジメン】

day 1 アクプラ 70mg/m²day 1,2,3,4,5 5-FU 500mg/m²

day 6~21 休薬

上記を3週毎に繰り返す。

【治療内容】

実施日	投与薬剤	経路	投薬内容	時間
day1 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド125mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。 ③開始60-90分前に内服。	
	<input type="checkbox"/> ② デキサート6mg+ アロキシバグ50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ③ アクプラ () mg+ 生食500mL	点滴	治療薬です。	120分
	<input type="checkbox"/> ④ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
	<input type="checkbox"/> ⑤ 5-FU () mg+ ラクテック500mL	持続点滴	治療薬です。 24時間毎に	④終了後 24時間
day2 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ② 5-FU () mg+ ラクテック500mL	持続点滴	治療薬です。 24時間毎に	24時間
day3 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ② 5-FU () mg+ ラクテック500mL	持続点滴	治療薬です。 24時間毎に	24時間
day4 (/)	<input type="checkbox"/> ① 5-FU () mg+ ラクテック500mL	持続点滴	治療薬です。 24時間毎に	24時間
day5 (/)	<input type="checkbox"/> ① 5-FU () mg+ ラクテック500mL	持続点滴	治療薬です。 24時間毎に	24時間
	<input type="checkbox"/> ② 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	①終了後 15分

【化学療法施行前に処方する薬剤】

- ・イメンドセット 1セット

【化学療法に関わる指示】

嘔気時：メトクロプラミド () A 静注およびデキサート () mg 静注 ※配合変化のため混合しない
上記効果が不十分な場合

オランザピンOD錠5mg 1錠内服（1日1回のみ使用可）※糖尿病の既往がある場合は使用不可

吃逆時：メトクロプラミド1A静注

コントミン10mg 1A 筋注

※メトクロプラミド（注射・錠剤）とH2ブロッカー（注射）またはPPI（注射）は原則併用禁忌です。