

## アクブラ療法

【レジメン】

day 1 ③アクブラ 80~100mg/m<sup>2</sup>

day 2~28 休薬

上記を4週毎に繰り返す。

## 【治療内容】

実施日	投与薬剤	経路	投薬内容	時間
day1 ( / )	<input type="checkbox"/> ① イメンド125mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。 ③開始60-90分前に内服。	
	<input type="checkbox"/> ② デキサート6mg+ アロキシバック50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ③ アクブラ ( ) mg+ 生食500mL	点滴	治療薬です。	120分
	<input type="checkbox"/> ④ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
day2 ( / )	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
day3 ( / )	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後

## 【化学療法施行前に処方する薬剤】

・イメンドセット 1セット

(外来ケモの場合：イメンド125mg 1Cは治療当日に汎用で、イメンド80mg 2Cは院外処方箋で対応)

## 【化学療法に関わる指示】

嘔気時：メトクロプラミド ( ) A 静注およびデキサート ( ) mg 静注 ※配合変化のため混合しない  
上記効果が不十分な場合オランザピンOD錠5mg 1錠内服 (1日1回のみ使用可) ※糖尿病の既往がある場合は使用不可吃逆時：メトクロプラミド1A静注コントミン10mg 1A 筋注※メトクロプラミド (注射・錠剤) とH2ブロッカー (注射) またはPPI (注射) は原則併用禁忌です。国立病院機構函館病院 外科・消化器科  
令和元年5月1日