

## 【レジメン】

day 1,15

day 1

day 1,2,3,4,5

DTX 30-40mg/m<sup>2</sup>CDDP 80mg/m<sup>2</sup>5-FU 800mg/m<sup>2</sup>

上記を4週毎に繰り返す。

## 【治療内容】

実施日	投与薬剤	経路	投薬内容	時間
day1 ( / )	<input type="checkbox"/> ① イメンド125mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。 ⑥開始60-90分前に内服。	
	<input type="checkbox"/> ② デキサート12mg+ アロキシバッグ50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ③ ドセタキセル ( ) mg+ 生食500mL	点滴	治療薬です。	120分
	<input type="checkbox"/> ④ ソリタT3 500mL+ 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL	点滴	腎障害予防の点滴です。	60分
	<input type="checkbox"/> ⑤ 20%マンニトール 300mL	点滴	利尿剤です。	30分
	<input type="checkbox"/> ⑥ CDDP ( ) mg+ 生食250mL	点滴	治療薬です。	120分
	<input type="checkbox"/> ⑦ ソリタT3 1000mL	点滴	腎障害予防の点滴です。	120分
	<input type="checkbox"/> ⑧ フロセミド20mg 1A	静注	利尿剤です。	
	<input type="checkbox"/> ⑨ 5-FU ( ) mg+ ラクテック500mL	持続点滴	治療薬です。 以後、24時間毎に	⑧終了後 24時間
day2 ( / )	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	午前中
	<input type="checkbox"/> ② デキサート8mg+生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ③ 5-FU ( ) mg+ ラクテック500mL	持続点滴	治療薬です。 24時間毎に	24時間
day3 ( / )	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	午前中
	<input type="checkbox"/> ② デキサート8mg+生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ③ 5-FU ( ) mg+ ラクテック500mL	持続点滴	治療薬です。 24時間毎に	24時間
day4 ( / )	<input type="checkbox"/> ① デキサート8mg+生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ② 5-FU ( ) mg+ ラクテック500mL	持続点滴	治療薬です。 24時間毎に	24時間
day5 ( / )	<input type="checkbox"/> ① デキサート8mg+生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ② 5-FU ( ) mg+ ラクテック500mL	持続点滴	治療薬です。 24時間毎に	24時間
	<input type="checkbox"/> ③ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	②終了後 15分
day15 ( / )	<input type="checkbox"/> ① デキサート8mg+ グラニセトロンバッグ1mg/50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ② ドセタキセル ( ) mg+ 生食500mL	点滴	治療薬です。	120分
	<input type="checkbox"/> ③ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分

## 【化学療法施行前に処方する薬剤】

・イメンドセット 1セット

## 【化学療法に関わる指示】

嘔気時：□メトクロプラミド ( ) A 静注およびデキサート ( ) mg 静注 ※配合変化のため混合しない

□グラニセトロンバッグ1mg/50mL 15分 (day15~19のみ使用可能)

上記効果が不十分な場合

□オランザピンOD錠5mg 1錠内服 (1日1回のみ使用可) ※糖尿病の既往がある場合は使用不可

吃逆時：□メトクロプラミド1A静注

□コントミン10mg 1A 筋注

※メトクロプラミド (注射・錠剤) とH2ブロッカー (注射) またはPPI (注射) は原則併用禁忌です。