

【レジメン】

day 1

CDDP 80mg/m²

day 1,2,3,4,5

5-FU 800mg/m²

day 6~21

休薬

上記を3~4週毎に繰り返す。

【治療内容】

実施日	投与薬剤	経路	投薬内容	時間
day1 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド125mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。 ⑤開始60-90分前に内服。	
	<input type="checkbox"/> ② デキサート12mg+ アロキシバグ50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ③ ソリタT3 500mL+ 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL	点滴	腎障害予防の点滴です。	60分
	<input type="checkbox"/> ④ 20%マンニトール 300mL	点滴	利尿剤です。	30分
	<input type="checkbox"/> ⑤ CDDP () mg+ 生食250mL	点滴	治療薬です。	120分
	<input type="checkbox"/> ⑥ ソリタT3 1000mL	点滴	腎障害予防の点滴です。	120分
	<input type="checkbox"/> ⑦ フロセミド20mg 1A	静注	利尿剤です。	
	<input type="checkbox"/> ⑧ 5-FU () mg+ ラクテック500mL	持続点滴	治療薬です。 以後、24時間毎に	⑦終了後 24時間
day2 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	午前中
	<input type="checkbox"/> ② デキサート8mg+生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ③ 5-FU () mg+ ラクテック500mL	持続点滴	治療薬です。 24時間毎に	24時間
day3 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	午前中
	<input type="checkbox"/> ② デキサート8mg+生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ③ 5-FU () mg+ ラクテック500mL	持続点滴	治療薬です。 24時間毎に	24時間
day4 (/)	<input type="checkbox"/> ① デキサート8mg+生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ② 5-FU () mg+ ラクテック500mL	持続点滴	治療薬です。 24時間毎に	24時間
day5 (/)	<input type="checkbox"/> ① デキサート8mg+生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ② 5-FU () mg+ ラクテック500mL	持続点滴	治療薬です。 24時間毎に	24時間
	<input type="checkbox"/> ③ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	②終了後 15分

【化学療法施行前に処方する薬剤】

・イメンドセット 1セット

【化学療法に関わる指示】

嘔気時：メトクロプラミド () A 静注およびデキサート () mg 静注 ※配合変化のため混合しない
上記効果が不十分な場合

オランザピンOD錠5mg 1錠内服（1日1回のみ使用可）※糖尿病の既往がある場合は使用不可

吃逆時：メトクロプラミド1A静注

コントミン10mg 1A 筋注

※メトクロプラミド（注射・錠剤）とH2ブロッカー（注射）またはPPI（注射）は原則併用禁忌です。