

## 【レジメン】

day 1	③オキサリプラチン 85mg/m <sup>2</sup>
day 1	④レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup>
day 1	⑤5-FU 400mg/m <sup>2</sup>
day 1~3	⑥5-FU 2400mg/m <sup>2</sup>
day 4~14	休薬

上記を2週毎に繰り返す。

## 【治療内容】

実施日	投与薬剤	経路	投薬内容	時間
day1 ( / ) }	<input type="checkbox"/> ① イメンド125mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。 ③開始60-90分前に内服。	
	<input type="checkbox"/> ② デキサート6mg+ アロキシバク50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ③ オキサリプラチン ( ) mg+ 5%ブドウ糖液250mL	点滴	治療薬です。	③,④同時に 120分
	<input type="checkbox"/> ④ レボホリナート ( ) mg+ 5%ブドウ糖液250mL	点滴	治療薬です。	
	<input type="checkbox"/> ⑤ 5-FU ( ) mg+ 生食50mL	点滴	治療薬です。	③,④終了後 全開
	<input type="checkbox"/> ⑥ 5-FU ( ) mg+ 生食1000mL	持続点滴	治療薬です。	⑤終了後 46時間
	<input type="checkbox"/> ⑦ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
day2 ( / )	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
day3 ( / )	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後

## 【化学療法施行前に処方する薬剤】

・イメンドセット 1セット

## 【化学療法に関わる指示】

嘔気時：メトクロプラミド ( ) A 静注およびデキサート ( ) mg 静注 ※配合変化のため混合しない  
上記効果が不十分な場合  
オランザピンOD錠5mg 1錠内服（1日1回のみ使用可）※糖尿病の既往がある場合は使用不可

吃逆時：メトクロプラミド1A静注  
コントミン10mg 1A 筋注  
※メトクロプラミド（注射・錠剤）とH2ブロッカー（注射）またはPPI（注射）は原則併用禁忌です。

国立病院機構函館病院 令和元年5月1日  
外科・消化器科