

【レジメン】

day 1 ②CPT-11 150mg/m²

day 2~14 休薬

※B法：1日1回、150mg/m²を2週間間隔で2~3回点滴静注し、少なくとも3週間休薬する。

【治療内容】

実施日	投与薬剤	経路	投薬内容	時間
day1 (/)	<input type="checkbox"/> ① デキサート12mg+ アロキシバック50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ② イリノテカン()mg+ 生食500mL	点滴	治療薬です。	120分
	<input type="checkbox"/> ③ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分

【化学療法に関わる指示】

嘔気時：メトクロプラミド()A 静注およびデキサート()mg 静注 ※配合変化のため混合しない
上記効果が不十分な場合

オランザピンOD錠5mg 1錠内服(1日1回のみ使用可) ※糖尿病の既往がある場合は使用不可

吃逆時：メトクロプラミド1A静注

コントミン10mg 1A 筋注

※メトクロプラミド(注射・錠剤)とH2ブロッカー(注射)またはPPI(注射)は原則併用禁忌です。

国立病院機構函館病院 外科・消化器科
令和元年5月1日