

【レジメン】

day 1	④サイラムザ 8mg/kg
day 1	⑥CPT-11 180mg/m ²
day 1	⑦レボホリナート 200mg/m ²
day 1	⑧5-FU 400mg/m ²
day 1~3	⑨5-FU 2400mg/m ²
day 4~14	休薬

上記を2週毎に繰り返す。

【治療内容】

実施日	投与薬剤	経路	投薬内容	時間
day1 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド125mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。 ⑥開始60-90分前に内服。	
day3 (/)	<input type="checkbox"/> ② ポララミン注5mg+ 生食50mL	点滴	過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ③ デキサート6mg+ アロキシバグ50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ④ サイラムザ() mg+ 生食250mL	点滴	治療薬です。 *フィルター付輸液セット使用	60分
	<input type="checkbox"/> ⑤ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
	<input type="checkbox"/> ⑥ イリノテカン() mg+ 5%ブドウ糖液250mL	点滴	治療薬です。	⑥,⑦同時 に 120 分
	<input type="checkbox"/> ⑦ レボホリナート() mg+ 5%ブドウ糖液250mL	点滴	治療薬です。	
	<input type="checkbox"/> ⑧ 5-FU() mg+ 生食50mL	点滴	治療薬です。	⑥,⑦終了 後 全開
	<input type="checkbox"/> ⑨ 5-FU() mg+ 生食1000mL	持続点滴	治療薬です。	⑧終了後 46時間
	<input type="checkbox"/> ⑩ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
	day2 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。
day3 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後

【化学療法施行前に処方する薬剤】

- ・イメンドセット 1セット

【化学療法に関わる指示】

- 嘔気時：メトクロプラミド() A 静注およびデキサート() mg 静注 ※配合変化のため混合しない
上記効果が不十分な場合
オランザピンOD錠5mg 1錠内服(1日1回のみ使用可) ※糖尿病の既往がある場合は使用不可
- 吃逆時：メトクロプラミド1A静注
コントミン10mg 1A 筋注
- ※メトクロプラミド(注射・錠剤)とH2ブロッカー(注射)またはPPI(注射)は原則併用禁忌です。