

【レジメン】

day 1,15 ③イリノテカン 125mg/m²
 day 1~14 ・S-1 40-60mg/回、2回/day
 day 15~28 ・S-1 休薬
 上記を4週毎に繰り返す。

S-1の初回基準量について

体表面積	1回用量	1日用量
1.25m ² 未満	40mg	80mg/day
1.25m ² 以上~1.5m ² 未満	50mg	100mg/day
1.5m ² 以上	60mg	120mg/day

【治療内容】

実施日	投与薬剤	経路	投薬内容	時間
day1 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド125mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。 ③開始60-90分前に内服。	
	<input type="checkbox"/> ② デキサート6mg+ アロキシバッグ50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ③ イリノテカン() mg+ 5%ブドウ糖液250mL	点滴	治療薬です。	90分
	<input type="checkbox"/> ④ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
S-1内服開始、本日々より14日間継続。				
day2 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
day3 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
day15 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド125mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。 ③開始60-90分前に内服。	
	<input type="checkbox"/> ② デキサート6mg+ アロキシバッグ50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ③ イリノテカン() mg+ 5%ブドウ糖液250mL	点滴	治療薬です。	90分
	<input type="checkbox"/> ④ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
本今朝にてS-1内服終了、2週間休薬すること。				
day16 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
day17 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
day29 (/)	次コース開始。			

【化学療法に関わる指示】

嘔気時：メトクロプラミド() A 静注およびデキサート() mg 静注 ※配合変化のため混合しない
 上記効果が不十分な場合
オランザピンOD錠5mg 1錠内服(1日1回のみ使用可) ※糖尿病の既往がある場合は使用不可
 吃逆時：メトクロプラミド1A静注
コントミン10mg 1A 筋注
 ※メトクロプラミド(注射・錠剤)とH2ブロッカー(注射)またはPPI(注射)は原則併用禁忌です。