

【レジメン】

day 1 パクリタキセル 175mg/m²
 day 1,8 ゲムシタピン 1250mg/m²
 day 9~21 休薬
 上記を3週毎に繰り返す。

【治療内容】

実施日	投与薬剤	経路	投薬内容	時間
day1 (/)	<input type="checkbox"/> ① デキサート20mg+ラニチジン注50mg+ 生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ② レスタミンコーワ錠10mg 5錠	内服	過敏症予防の内服薬です。	①開始時
	<input type="checkbox"/> ③ グラニセトロンバッグ1mg/50mL	点滴	吐き気予防の点滴です。	30分
	<input type="checkbox"/> ④ パクリタキセル () mg+ 5%ブドウ糖液500mL	点滴	治療薬です。 *フィルター付輸液セット使用	*180分
	<input type="checkbox"/> ⑤ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
	<input type="checkbox"/> ⑥ ゲムシタピン () mg+ 生食100mL	点滴	治療薬です。	30分
	<input type="checkbox"/> ⑦ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
day8 (/)	<input type="checkbox"/> ① デキサート8mg+ 生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ② ゲムシタピン () mg+ 生食100mL	点滴	治療薬です。	30分
	<input type="checkbox"/> ③ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
day15	休薬			

※パクリタキセルを含む輸液は流量速度が低下するため、滴数を増加する必要があります。

【化学療法施行前に処方する薬剤】

・レスタミンコーワ錠 10mg 5錠 1回分

【化学療法に関わる指示】

嘔気時：メトクロプラミド () A 静注およびデキサート () mg 静注 ※配合変化のため混合しない
 上記効果が不十分な場合

オランザピンOD錠5mg 1錠内服 (1日1回のみ使用可) ※糖尿病の既往がある場合は使用不可

吃逆時：メトクロプラミド 1A 静注

コントミン10mg 1A 筋注

※メトクロプラミド (注射・錠剤) とH2ブロッカー (注射) またはPPI (注射) は原則併用禁忌です。