

## 【レジメン】

day 1,8,15 ④パクリタキセル 80mg/m<sup>2</sup>

day 1,15 ⑥アバスチン 10mg/kg

上記を4週毎に繰り返す。

## 【治療内容】

実施日	投与薬剤	経路	投薬内容	時間
day1 ( / )	<input type="checkbox"/> ① デキサート8mg+ラニチジン注50mg+生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ② レスタミンコーワ錠10mg 5錠	内服	過敏症予防の内服薬です。	①開始時
	<input type="checkbox"/> ③ グラニセトロンバッグ1mg/50mL	点滴	吐き気予防の点滴です。	30分
	<input type="checkbox"/> ④ パクリタキセル ( ) mg+5%ブドウ糖液250mL	点滴	治療薬です。 *フィルター付輸液セット使用	*60分
	<input type="checkbox"/> ⑤ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
	<input type="checkbox"/> ⑥ アバスチン ( ) mg+生食100mL	点滴	治療薬です。 *BVの投与速度は下記参照	90・60・30分
	<input type="checkbox"/> ⑦ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
day8 ( / )	<input type="checkbox"/> ① デキサート8mg+ラニチジン注50mg+生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ② レスタミンコーワ錠10mg 5錠	内服	過敏症予防の内服薬です。	①開始時
	<input type="checkbox"/> ③ グラニセトロンバッグ1mg/50mL	点滴	吐き気予防の点滴です。	30分
	<input type="checkbox"/> ④ パクリタキセル ( ) mg+5%ブドウ糖液250mL	点滴	治療薬です。 *フィルター付輸液セット使用	*60分
	<input type="checkbox"/> ⑤ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
day15 ( / )	<input type="checkbox"/> ① デキサート8mg+ラニチジン注50mg+生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ② レスタミンコーワ錠10mg 5錠	内服	過敏症予防の内服薬です。	①開始時
	<input type="checkbox"/> ③ グラニセトロンバッグ1mg/50mL	点滴	吐き気予防の点滴です。	30分
	<input type="checkbox"/> ④ パクリタキセル ( ) mg+5%ブドウ糖液250mL	点滴	治療薬です。 *フィルター付輸液セット使用	*60分
	<input type="checkbox"/> ⑤ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
	<input type="checkbox"/> ⑥ アバスチン ( ) mg+生食100mL	点滴	治療薬です。 *BVの投与速度は下記参照	90・60・30分
	<input type="checkbox"/> ⑦ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
day22	休薬			

※パクリタキセルを含む輸液は流量速度が低下するため、滴数を増加する必要があります。

※アバスチンの投与速度：初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とすることができる。

## 【化学療法施行前に処方する薬剤】

- ・レスタミンコーワ錠10mg 5錠 3回分

## 【化学療法に関わる指示】

嘔気時：□メトクロプラミド ( ) A 静注およびデキサート ( ) mg 静注 ※配合変化のため混合しない  
上記効果が不十分な場合

□オランザピンOD錠5mg 1錠内服 (1日1回のみ使用可) ※糖尿病の既往がある場合は使用不可

吃逆時：□メトクロプラミド1A静注

□コントミン10mg 1A 筋注

※メトクロプラミド (注射・錠剤) とH2ブロッカー (注射) またはPPI (注射) は原則併用禁忌です。