

【レジメン】

day 1,8,15 ④パクリタキセル 80mg/m²

day 16~28 休薬

上記を4週毎に繰り返す。

【治療内容】

実施日	投与薬剤	経路	投薬内容	時間
day1 (/)	<input type="checkbox"/> ① デキサート8mg+ラニチジン注50mg+生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ② レスタミンコーワ錠10mg 5錠	内服	過敏症予防の内服薬です。	①開始時
	<input type="checkbox"/> ③ グラニセトロンバッグ1mg/50mL	点滴	吐き気予防の点滴です。	30分
	<input type="checkbox"/> ④ パクリタキセル () mg+5%ブドウ糖液250mL	点滴	治療薬です。 *フィルター付輸液セット使用	*60分
	<input type="checkbox"/> ⑤ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
day8 (/)	<input type="checkbox"/> ① デキサート8mg+ラニチジン注50mg+生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ② レスタミンコーワ錠10mg 5錠	内服	過敏症予防の内服薬です。	①開始時
	<input type="checkbox"/> ③ グラニセトロンバッグ1mg/50mL	点滴	吐き気予防の点滴です。	30分
	<input type="checkbox"/> ④ パクリタキセル () mg+5%ブドウ糖液250mL	点滴	治療薬です。 *フィルター付輸液セット使用	*60分
	<input type="checkbox"/> ⑤ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
day15 (/)	<input type="checkbox"/> ① デキサート8mg+ラニチジン注50mg+生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ② レスタミンコーワ錠10mg 5錠	内服	過敏症予防の内服薬です。	①開始時
	<input type="checkbox"/> ③ グラニセトロンバッグ1mg/50mL	点滴	吐き気予防の点滴です。	30分
	<input type="checkbox"/> ④ パクリタキセル () mg+5%ブドウ糖液250mL	点滴	治療薬です。 *フィルター付輸液セット使用	*60分
	<input type="checkbox"/> ⑤ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
day22	休薬			

※パクリタキセルを含む輸液は流量速度が低下するため、滴数を増加する必要があります。

【化学療法施行前に処方する薬剤】

- ・レスタミンコーワ錠10mg 5錠 3回分

【化学療法に関わる指示】

嘔気時：メトクロプラミド () A 静注およびデキサート () mg 静注 ※配合変化のため混合しない
上記効果が不十分な場合

オランザピンOD錠5mg 1錠内服 (1日1回のみ使用可) ※糖尿病の既往がある場合は使用不可

吃逆時：メトクロプラミド1A静注

コントミン10mg 1A 筋注

※メトクロプラミド (注射・錠剤) とH2ブロッカー (注射) またはPPI (注射) は原則併用禁忌です。