

【レジメン】

day 1 ③5-FU 500mg/m²
 day 1 ④エピルピシン 100mg/m²
 day 1 ⑤エンドキサン 500mg/m²
 day 2 ④ジールスタ皮下注3.6mg
 day 2~21 休薬
 上記を3週毎に繰り返す。

【治療内容】

| 実施日 | 投与薬剤 | 経路 | 投薬内容 | 時間 |
|---------------|--|----|---------------------------------------|-----|
| day1 (/) | <input type="checkbox"/> ① イメンド125mg 1カプセル | 内服 | 吐き気予防薬です。 ③開始60-90分前に内服。 | |
| | <input type="checkbox"/> ② デキサート12mg+ アロキシバッグ50mL | 点滴 | 吐き気・過敏症予防の点滴です。 | 15分 |
| | <input type="checkbox"/> ③ 5-FU () mg+ 生食100mL | 点滴 | 治療薬です。 | 30分 |
| | <input type="checkbox"/> ④ エピルピシン () mg+ 生食50mL | 点滴 | 治療薬です。 | 全開 |
| | <input type="checkbox"/> ⑤ エンドキサン () mg+ 生食100mL | 点滴 | 治療薬です。 | 30分 |
| | <input type="checkbox"/> ⑥ 生食50mL | 点滴 | ルート内をフラッシュします。 | 15分 |
| day2 (/) | <input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル | 内服 | 吐き気予防薬です。 | 朝食後 |
| | <input type="checkbox"/> ② デカドロン0.5mg 8錠 | 内服 | 吐き気・過敏症予防薬です。 | 朝食後 |
| | <input type="checkbox"/> ③ デカドロン0.5mg 8錠 | 内服 | 吐き気・過敏症予防薬です。 | 夕食後 |
| | <input type="checkbox"/> ④ ジールスタ皮下注3.6mg (冷所保存) | 皮下 | 好中球減少に伴う発熱を予防します。 ※化学療法終了から24時間以降。 | |
| day3 (/) | <input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル | 内服 | 吐き気予防薬です。 | 朝食後 |
| | <input type="checkbox"/> ② デカドロン0.5mg 8錠 | 内服 | 吐き気・過敏症予防薬です。 | 朝食後 |
| | <input type="checkbox"/> ③ デカドロン0.5mg 8錠 | 内服 | 吐き気・過敏症予防薬です。 | 夕食後 |
| day4 (/) | <input type="checkbox"/> ① デカドロン0.5mg 8錠 | 内服 | 吐き気・過敏症予防薬です。 | 朝食後 |
| | <input type="checkbox"/> ② デカドロン0.5mg 8錠 | 内服 | 吐き気・過敏症予防薬です。 | 夕食後 |

【化学療法施行前に処方する薬剤】

- ・イメンドセット 1セット
(外来の場合：イメンド125mg 1Cは治療当日に汎用で、イメンド80mg 2Cは院外処方箋で対応)
- ・デカドロン錠0.5mg 16錠/2x朝・夕食後 3日

【化学療法に関わる指示】

嘔気時：□メトクロプラミド () A 静注およびデキサート () mg 静注 ※配合変化のため混合しない
 上記効果が不十分な場合
 □オランザピンOD錠5mg 1錠内服 (1日1回のみ使用可) ※糖尿病の既往がある場合は使用不可
 吃逆時：□メトクロプラミド1A静注
 □コントミン10mg 1A 筋注
 ※メトクロプラミド (注射・錠剤) とH2ブロッカー (注射) またはPPI (注射) は原則併用禁忌です。