

【レジメン】

day 1,2,3

カルセド 40mg/m²

上記を3~4週毎に繰り返す。

【治療内容】

実施日	投与薬剤	経路	投薬内容	時間
day1 (/)	<input type="checkbox"/> ① デキサート12mg+ アロキシバッグ50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ② 生食100mL	点滴	ルート確保の点滴です。	30分
	<input type="checkbox"/> ③ ②の側管から カルセド() mg+生食50mL	点滴	治療薬です。 ※調製後は冷所保存です。	②開始時 15分
day2 (/)	<input type="checkbox"/> ① 生食100mL	点滴	ルート確保の点滴です。	30分
	<input type="checkbox"/> ② ①の側管から カルセド() mg+生食50mL	点滴	治療薬です。 ※調製後は冷所保存です。	①開始時 15分
day3 (/)	<input type="checkbox"/> ① 生食100mL	点滴	ルート確保の点滴です。	30分
	<input type="checkbox"/> ② ①の側管から カルセド() mg+生食50mL	点滴	治療薬です。 ※調製後は冷所保存です。	①開始時 15分

【化学療法に関わる指示】

嘔気時：メトクロプラミド() A 静注およびデキサート() mg 静注 ※配合変化のため混合しない
上記効果が不十分な場合

オランザピンOD錠5mg 1錠内服(1日1回のみ使用可) ※糖尿病の既往がある場合は使用不可

吃逆時：メトクロプラミド1A静注

コントミン10mg 1A 筋注

※メトクロプラミド(注射・錠剤)とH2ブロッカー(注射)またはPPI(注射)は原則併用禁忌です。

国立病院機構函館病院 呼吸器科

令和元年5月1日