

【レジメン】

day 1,2,3

day 1

③エトポシド 80mg/m²

⑤カルボプラチン AUC=3・4・5

カルボプラチン投与量=AUC x(Ccr xBSA/1.48+25)

※カルボプラチンの最大投与量はAUC×150までとすること。

AUC	2	3	4	5	6
最大投与量(mg)	300	450	600	750	900

Cockcroft-Gault式

$$Ccr(mL/min) = (140 - \text{年齢}) \times \frac{\text{体重}(kg)}{72} \times \frac{1}{Scr(mg/dL)}$$

女性の場合、Ccrに0.85をかける。

上記を3週毎に繰り返す。

【治療内容】

実施日	投与薬剤	経路	投薬内容	時間
day1 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド125mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	
	<input type="checkbox"/> ② デキサート6mg+ アロキシバック50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ③ エトポシド()mg+ 生食500mL	点滴	治療薬です。	120分
	<input type="checkbox"/> ④ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
	<input type="checkbox"/> ⑤ カルボプラチン()mg+ 5%ブドウ糖液250mL	点滴	治療薬です。	60分
	<input type="checkbox"/> ⑥ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
day2 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ② デキサート4mg+ 生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ③ エトポシド()mg+ 生食500mL	点滴	治療薬です。	120分
	<input type="checkbox"/> ④ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
day3 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ② デキサート4mg+ 生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ③ エトポシド()mg+ 生食500mL	点滴	治療薬です。	120分
	<input type="checkbox"/> ④ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分

【化学療法に関わる指示】

嘔気時：メトクロプラミド()A 静注およびデキサート()mg 静注 ※配合変化のため混合しない

上記効果が不十分な場合

オランザピンOD錠5mg 1錠内服(1日1回のみ使用可) ※糖尿病の既往がある場合は使用不可吃逆時：メトクロプラミド1A静注コントミン10mg 1A 筋注

※メトクロプラミド(注射・錠剤)とH2ブロッカー(注射)またはPPI(注射)は原則併用禁忌です。