

## 【レジメン】

day 1,8 GEM 1000mg/m<sup>2</sup>day 1 CDDP 80mg/m<sup>2</sup>

上記を3週毎に繰り返す。

\*Short hydrationレジメンは、初回治療中に悪心・嘔吐、腎障害がGrade1以下の場合にのみ使用すること。

\*day2、3には通常の飲水に加えて、経口補水液などを1日1,000mL以上飲水すること。

## 【治療内容】

実施日	投与薬剤	経路	投薬内容	時間
day1 ( / )	<input type="checkbox"/> ① イメンド125mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。 ⑥開始60-90分前までに内服。	
	<input type="checkbox"/> ② デキサート12mg+ アロキシバグ50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ③ ゲムシタピン( ) mg+ 生食100mL	点滴	治療薬です。	30分
	<input type="checkbox"/> ④ ソリタT3 500mL+ 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL	点滴	腎障害予防の点滴です。	60分
	<input type="checkbox"/> ⑤ 20%マンニトール 300mL	点滴	利尿剤です	30分
	<input type="checkbox"/> ⑥ CDDP( ) mg+ 生食250mL	点滴	治療薬です。	60分
	<input type="checkbox"/> ⑦ ソリタT3 1000mL	点滴	腎障害予防の点滴です。	120分
	<input type="checkbox"/> ⑧ フロセミド20mg 1A	静注	利尿剤です	
day2 ( / )	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ② デカドロン0.5mg 8錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ③ デカドロン0.5mg 8錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	夕食後
day3 ( / )	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ② デカドロン0.5mg 8錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ③ デカドロン0.5mg 8錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	夕食後
day4 ( / )	<input type="checkbox"/> ① デカドロン0.5mg 8錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ② デカドロン0.5mg 8錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	夕食後
day8 ( / )	<input type="checkbox"/> ① デキサート8mg+生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ② ゲムシタピン( ) mg+ 生食100mL	点滴	治療薬です。	30分
	<input type="checkbox"/> ③ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分

## 【化学療法施行前に処方する薬剤】

・イメンドセット 1セット

(外来ケモの場合：イメンド125mg 1Cは治療当日に汎用で、イメンド80mg 2Cは院外処方箋で対応)

・デカドロン錠0.5mg 16錠/2x朝・夕食後 3日

嘔気時：□グラニセトロンバグ1mg/50mL 15分 (day8~12のみ使用可能)

□メトクロプラミド( ) A 静注およびデキサート( ) mg 静注 ※配合変化のため混合しない

上記効果が不十分な場合

□オランザピンOD錠5mg 1錠内服 (1日1回のみ使用可) ※糖尿病の既往がある場合は使用不可

吃逆時：□メトクロプラミド1A静注

□コントミン10mg 1A 筋注

※メトクロプラミド(注射・錠剤)とH2ブロッカー(注射)またはPPI(注射)は原則併用禁忌です。