

【レジメン】

day 1,8 GEM 1000mg/m²day 1 CDDP 80mg/m²

上記を3週毎に繰り返す。

【治療内容】

| 実施日 | 投与薬剤 | 経路 | 投薬内容 | 時間 |
|---------------|--|----|-----------------|------|
| day1 (/) | <input type="checkbox"/> ① イメンド125mg 1カプセル | 内服 | 吐き気予防薬です。 | 朝食後 |
| | <input type="checkbox"/> ② 生食500mL | 点滴 | 腎障害予防の点滴です。 | 60分 |
| | <input type="checkbox"/> ③ デキサート12mg+ アロキシバッグ50mL | 点滴 | 吐き気・過敏症予防の点滴です。 | 15分 |
| | <input type="checkbox"/> ④ ゲムシタピン() mg+ 生食100mL | 点滴 | 治療薬です。 | 30分 |
| | <input type="checkbox"/> ⑤ ソリタT3 500mL+ 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL | 点滴 | 腎障害予防の点滴です。 | 60分 |
| | <input type="checkbox"/> ⑥ 20%マンニトール 300mL | 点滴 | 利尿剤です | 30分 |
| | <input type="checkbox"/> ⑦ CDDP() mg+ 生食250mL | 点滴 | 治療薬です。 | 120分 |
| | <input type="checkbox"/> ⑧ ソリタT3 1000mL | 点滴 | 腎障害予防の点滴です。 | 120分 |
| | <input type="checkbox"/> ⑨ フロセミド20mg 1A | 静注 | 利尿剤です | |
| day2 (/) | <input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル | 内服 | 吐き気予防薬です。 | 朝食後 |
| | <input type="checkbox"/> ② デキサート8mg+ 生食50mL | 点滴 | 吐き気・過敏症予防の点滴です。 | 15分 |
| | <input type="checkbox"/> ③ ソリタT3 1500mL | 点滴 | 腎障害予防の点滴です。 | 180分 |
| day3 (/) | <input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル | 内服 | 吐き気予防薬です。 | 朝食後 |
| | <input type="checkbox"/> ② デキサート8mg+生食50mL | 点滴 | 吐き気・過敏症予防の点滴です。 | 15分 |
| | <input type="checkbox"/> ③ ソリタT3 1500mL | 点滴 | 腎障害予防の点滴です。 | 180分 |
| day4 (/) | <input type="checkbox"/> ① デキサート8mg+ 生食50mL | 点滴 | 吐き気・過敏症予防の点滴です。 | 15分 |
| day8 (/) | <input type="checkbox"/> ① デキサート8mg+生食50mL | 点滴 | 吐き気・過敏症予防の点滴です。 | 15分 |
| | <input type="checkbox"/> ② ゲムシタピン() mg+ 生食100mL | 点滴 | 治療薬です。 | 30分 |
| | <input type="checkbox"/> ③ 生食50mL | 点滴 | ルート内をフラッシュします。 | 15分 |

【化学療法に関わる指示】

嘔気時：グラニセトロンバッグ1mg/50mL 15分 (day8~12のみ使用可能)メトクロプラミド() A 静注およびデキサート() mg 静注 ※配合変化のため混合しない
上記効果が不十分な場合オランザピンOD錠5mg 1錠内服 (1日1回のみ使用可) ※糖尿病の既往がある場合は使用不可吃逆時：メトクロプラミド1A静注コントミン10mg 1A 筋注

※メトクロプラミド(注射・錠剤)とH2ブロッカー(注射)またはPPI(注射)は原則併用禁忌です。