

【レジメン】

day 1,8 VNR 20mg/m²
 day 1 CDDP 80mg/m²
 上記を3週毎に繰り返す。

【治療内容】

実施日	投与薬剤	経路	投薬内容	時間
day1 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド125mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	
	<input type="checkbox"/> ② 生食500mL	点滴	腎障害予防の点滴です。	60分
	<input type="checkbox"/> ③ デキサート12mg+ アロキシバグ50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ④ ビノレルピン() mg+ 生食50mL	点滴	治療薬です。	全開 6~10分
	<input type="checkbox"/> ⑤ ソリタT3 500mL+ 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL	点滴	腎障害予防の点滴です。	60分
	<input type="checkbox"/> ⑥ 20%マンニトール 300mL	点滴	利尿剤です	30分
	<input type="checkbox"/> ⑦ CDDP() mg+ 生食250mL	点滴	治療薬です。	120分
	<input type="checkbox"/> ⑧ ソリタT3 1000mL	点滴	腎障害予防の点滴です。	120分
	<input type="checkbox"/> ⑨ フロセミド20mg 1A	静注	利尿剤です	
day2 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ② デキサート8mg+生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ③ ソリタT3 1500mL	点滴	腎障害予防の点滴です。	180分
day3 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ② デキサート8mg+生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ③ ソリタT3 1500mL	点滴	腎障害予防の点滴です。	180分
day4 (/)	<input type="checkbox"/> ① デキサート8mg+ 生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
day8 (/)	<input type="checkbox"/> ① デキサート8mg+ 生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ② ビノレルピン() mg+ 生食50mL	点滴	治療薬です。	全開 6~10分
	<input type="checkbox"/> ③ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分

【化学療法に関わる指示】

嘔気時：□グラニセトロンバッグ1mg/50mL 15分 (day8~12のみ使用可能)

□メトクロプラミド() A 静注およびデキサート() mg 静注 ※配合変化のため混合しない
 上記効果が不十分な場合

□オランザピンOD錠5mg 1錠内服 (1日1回のみ使用可) ※糖尿病の既往がある場合は使用不可

吃逆時：□メトクロプラミド1A静注

□コントミン10mg 1A 筋注

※メトクロプラミド(注射・錠剤)とH2ブロッカー(注射)またはPPI(注射)は原則併用禁忌です。

尿量測定：day1~4まで毎日

体重測定：day1~4まで毎日