

【レジメン】

day 1,8 VNR 25mg/m²
 day 1 CDDP 80mg/m²
 上記を3週毎に繰り返す。

*Short hydrationレジメンは、初回治療中に悪心・嘔吐、腎障害がGrade1以下の場合にのみ使用すること。
 *day2、3には通常の飲水に加えて、経口補水液などを1日1,000mL以上飲水すること。

【治療内容】

実施日	投与薬剤	経路	投薬内容	時間
day1 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド125mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。 ⑥開始60-90分前までに内服。	
	<input type="checkbox"/> ② デキサート12mg+ アロキシバッグ50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ③ ビフレルピン () mg+ 生食50mL	点滴	治療薬です。	全開 6~10分
	<input type="checkbox"/> ④ ソリタT3 500mL+ 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL	点滴	腎障害予防の点滴です。	60分
	<input type="checkbox"/> ⑤ 20%マンニトール 300mL	点滴	利尿剤です	30分
	<input type="checkbox"/> ⑥ CDDP () mg+ 生食250mL	点滴	治療薬です。	60分
	<input type="checkbox"/> ⑦ ソリタT3 1000mL	点滴	腎障害予防の点滴です。	120分
	<input type="checkbox"/> ⑧ フロセミド20mg 1A	静注	利尿剤です	
day2 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ② デカドロン0.5mg 8錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ③ デカドロン0.5mg 8錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	夕食後
day3 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ② デカドロン0.5mg 8錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ③ デカドロン0.5mg 8錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	夕食後
day4 (/)	<input type="checkbox"/> ① デカドロン0.5mg 8錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ② デカドロン0.5mg 8錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	夕食後
day8 (/)	<input type="checkbox"/> ① デキサート8mg+ 生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ② ビフレルピン () mg+ 生食50mL	点滴	治療薬です。	全開 6~10分
	<input type="checkbox"/> ③ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	全開

【化学療法施行前に処方する薬剤】

- ・イメンドセット 1セット
(外来ケモの場合：イメンド125mg 1Cは治療当日に汎用で、イメンド80mg 2Cは院外処方箋で対応)
- ・デカドロン錠0.5mg 16錠/2x朝・夕食後 3日

【化学療法に関わる指示】

- 嘔気時：□グラニセトロンバッグ1mg/50mL 15分 (day8~12のみ使用可能)
 □メトクロプラミド () A 静注およびデキサート () mg 静注 ※配合変化のため混合しない
 上記効果が不十分な場合
 □オランザピンOD錠5mg 1錠内服 (1日1回のみ使用可) ※糖尿病の既往がある場合は使用不可
- 吃逆時：□メトクロプラミド1A静注
 □コントミン10mg 1A 筋注
※メトクロプラミド (注射・錠剤) とH2ブロッカー (注射) またはPPI (注射) は原則併用禁忌です。