

## 【レジメン】

day 1,8 VNR 25mg/m<sup>2</sup>day 1 CDDP 80mg/m<sup>2</sup>

上記を3週毎に繰り返す。

## 【治療内容】

実施日	投与薬剤	経路	投薬内容	時間
day1 ( / )	□① イメンド125mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
	□② 生食500mL	点滴	腎障害予防の点滴です。	60分
	□③ デキサート12mg+ アロキシバグ50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	□④ ビノレルピン( ) mg+ 生食50mL	点滴	治療薬です。	全開 6~10分
	□⑤ ソリタT3 500mL+ 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL	点滴	腎障害予防の点滴です。	60分
	□⑥ 20%マンニトール 300mL	点滴	利尿剤です	30分
	□⑦ CDDP( ) mg+ 生食250mL	点滴	治療薬です。	120分
	□⑧ ソリタT3 1000mL	点滴	腎障害予防の点滴です。	120分
	□⑨ フロセミド20mg 1A	静注	利尿剤です	
day2 ( / )	□① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
	□② デキサート8mg+生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	□③ ソリタT3 1500mL	点滴	腎障害予防の点滴です。	180分
day3 ( / )	□① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
	□② デキサート8mg+生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	□③ ソリタT3 1500mL	点滴	腎障害予防の点滴です。	180分
day4 ( / )	□① デキサート8mg+ 生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
day8 ( / )	□① デキサート8mg+ 生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	□② ビノレルピン( ) mg+ 生食50mL	点滴	治療薬です。	全開 6~10分
	□③ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	全開

## 【化学療法に関わる指示】

嘔気時：□グラニセトロンバッグ1mg/50mL 15分 (day8~12のみ使用可能)

□メトクロプラミド( ) A 静注およびデキサート( ) mg 静注 ※配合変化のため混合しない  
上記効果が不十分な場合

□オランザピンOD錠5mg 1錠内服 (1日1回のみ使用可) ※糖尿病の既往がある場合は使用不可

吃逆時：□メトクロプラミド1A静注

□コントミン10mg 1A 筋注

※メトクロプラミド(注射・錠剤)とH2ブロッカー(注射)またはPPI(注射)は原則併用禁忌です。