

【レジメン】

day 1 ③サイラムザ 10mg/kg
 day 1 ⑥ドセタキセル 60mg/m²
 day 2 ①ジールスタ皮下注3.6mg
 上記を3週毎に繰り返す。

【治療内容】

実施日	投与薬剤	経路	投薬内容	時間
day1 (/)	<input type="checkbox"/> ポラミン注5mg+ ① ガスター注20mg+生食50mL	点滴	過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> デキサート8mg+ ② グラニセトロンバッグ1mg/50mL	点滴	吐き気予防の点滴です。	30分
	<input type="checkbox"/> サイラムザ () mg+ ③ 生食250mL	点滴	治療薬です。 *フィルター付輸液セット使用	60分
	<input type="checkbox"/> ④ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
	※ 観 察 時 間			45分
	<input type="checkbox"/> ⑥ ドセタキセル () mg+ ⑥ 生食500mL	点滴	治療薬です。	120分
	<input type="checkbox"/> ⑦ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
day2 (/)	<input type="checkbox"/> ① ジールスタ皮下注3.6mg (冷所保存)	皮下	好中球減少に伴う発熱を予防します。 ※化学療法終了から24時間以降。	

※観察時間：Infusion reactionの発現確認のため、最初の2サイクルは必ずサイラムザ投与後1時間、観察時間を設けること。Infusion reactionの発現がなければ、3サイクル以降は省略可能。

【化学療法に関わる指示】

嘔気時：メトクロプラミド () A 静注およびデキサート () mg 静注 ※配合変化のため混合しない
 上記効果が不十分な場合
オランザピンOD錠5mg 1錠内服 (1日1回のみ使用可) ※糖尿病の既往がある場合は使用不可
 吃逆時：メトクロプラミド1A静注
コントミン10mg 1A 筋注
 ※メトクロプラミド (注射・錠剤) とH2ブロッカー (注射) またはPPI (注射) は原則併用禁忌です。