

## 【レジメン】

day 1,8 ②ビノレルピン 25mg/m<sup>2</sup>  
 day 1,8 ④ゲムシタピン 1000mg/m<sup>2</sup>  
 上記を3週毎に繰り返す。

## 【治療内容】

実施日	投与薬剤	経路	投薬内容	時間
day1 ( / )	<input type="checkbox"/> ① デキサート8mg+ 生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ② ビノレルピン ( ) mg+ 生食50mL	点滴	治療薬です。	全開 6~10分
	<input type="checkbox"/> ③ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	全開
	<input type="checkbox"/> ④ ゲムシタピン ( ) mg+ 生食100mL	点滴	治療薬です。	30分
	<input type="checkbox"/> ⑤ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
day8 ( / )	<input type="checkbox"/> ① デキサート8mg+ 生食50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	<input type="checkbox"/> ② ビノレルピン ( ) mg+ 生食50mL	点滴	治療薬です。	全開 6~10分
	<input type="checkbox"/> ③ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	全開
	<input type="checkbox"/> ④ ゲムシタピン ( ) mg+ 生食100mL	点滴	治療薬です。	30分
	<input type="checkbox"/> ⑤ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
day15	休薬			

## 【化学療法に関わる指示】

嘔気時：□グラニセトロンバッグ1mg/50mL 15分 (day8~12のみ使用可能)  
 □メトクロプラミド ( ) A 静注およびデキサート ( ) mg 静注 ※配合変化のため混合しない  
 上記効果が不十分な場合  
 □オランザピンOD錠5mg 1錠内服 (1日1回のみ使用可) ※糖尿病の既往がある場合は使用不可  
 吃逆時：□メトクロプラミド1A静注  
 □コントミン10mg 1A 筋注  
※メトクロプラミド (注射・錠剤) とH2ブロッカー (注射) またはPPI (注射) は原則併用禁忌です。

国立病院機構函館病院 呼吸器科  
 令和元年5月1日