

【レジメン】

day 1

カルボプラチン AUC=5

カルボプラチン投与量=AUC x(Ccr xBSA/1.48+25)

※カルボプラチンの最大投与量はAUC×150までとすること。

| AUC | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 最大投与量(mg) | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 |

Cockcroft-Gault式

$$\text{Ccr(mL/min)} = (140 - \text{年齢}) \times \frac{\text{体重(kg)}}{72} \times \frac{1}{\text{Scr(mg/dL)}}$$

女性の場合、Ccrに0.85をかける。

day 1,8

ゲムシタピン 1000mg/m²

上記を3週毎に繰り返す。

【治療内容】

| 実施日 | 投与薬剤 | 経路 | 投薬内容 | 時間 |
|---------------|---|----|-----------------|-----|
| day1 (/) | <input type="checkbox"/> ① イメンド125mg 1カプセル | 内服 | 吐き気予防薬です。 | |
| | <input type="checkbox"/> ② デキサート6mg+ アロキシバグ50mL | 点滴 | 吐き気・過敏症予防の点滴です。 | 15分 |
| | <input type="checkbox"/> ③ カルボプラチン() mg+ 5%ブドウ糖液250mL | 点滴 | 治療薬です。 | 60分 |
| | <input type="checkbox"/> ④ 生食50mL | 点滴 | ルート内をフラッシュします。 | 15分 |
| | <input type="checkbox"/> ⑤ ゲムシタピン() mg+ 生食100mL | 点滴 | 治療薬です。 | 30分 |
| | <input type="checkbox"/> ⑥ 生食50mL | 点滴 | ルート内をフラッシュします。 | 15分 |
| day2 (/) | <input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル | 内服 | 吐き気予防薬です。 | 朝食後 |
| day3 (/) | <input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル | 内服 | 吐き気予防薬です。 | 朝食後 |
| day8 (/) | <input type="checkbox"/> ① デキサート8mg+ 生食50mL | 点滴 | 吐き気・過敏症予防の点滴です。 | 15分 |
| | <input type="checkbox"/> ② ゲムシタピン() mg+ 生食100mL | 点滴 | 治療薬です。 | 30分 |
| | <input type="checkbox"/> ③ 生食50mL | 点滴 | ルート内をフラッシュします。 | 15分 |

【化学療法に関わる指示】

嘔気時：メトクロプラミド() A 静注およびデキサート() mg 静注 ※配合変化のため混合しない
上記効果が不十分な場合

オランザピンOD錠5mg 1錠内服(1日1回のみ使用可) ※糖尿病の既往がある場合は使用不可

吃逆時：メトクロプラミド1A静注

コントミン10mg 1A 筋注

※メトクロプラミド(注射・錠剤)とH2ブロッカー(注射)またはPPI(注射)は原則併用禁忌です。