

【レジメン】

day 1 ③カルボプラチン AUC=4・5・6
 カルボプラチン投与量=AUC x(Ccr xBSA/1.48+25)
 ※カルボプラチンの最大投与量はAUC×150までとすること。

AUC	2	3	4	5	6
最大投与量(mg)	300	450	600	750	900

Cockcroft-Gault式

$$\text{Ccr(mL/min)} = (140 - \text{年齢}) \times \frac{\text{体重(kg)}}{72} \times \frac{1}{\text{Scr(mg/dL)}}$$

女性の場合、Ccrに0.85をかける。

day 1~14 ・S-1 40-60mg/回、2回/day

上記を3週毎に繰り返す。

S-1の初回基準量について

体表面積	1回用量	1日用量
1.25m ² 未満	40mg	80mg/day
1.25m ² 以上~1.5m ² 未満	50mg	100mg/day
1.5m ² 以上	60mg	120mg/day

【治療内容】

実施日	投与薬剤	経路	投薬内容	時間
day1 (/)	□① イメンド125mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	
	□② デキサート6mg+ アロキシバグ50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
	□③ カルボプラチン() mg+ 5%ブドウ糖液250mL	点滴	治療薬です。	60分
	□④ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
S-1内服開始、本日夕より14日間継続。				
day2 (/)	□① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
day3 (/)	□① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
day15 (/)	本今朝にてS-1内服終了、1週間休薬すること。			

【化学療法に関わる指示】

嘔気時：□メトクロプラミド() A 静注およびデキサート() mg 静注 ※配合変化のため混合しない
 上記効果が不十分な場合

□オランザピンOD錠5mg 1錠内服(1日1回のみ使用可) ※糖尿病の既往がある場合は使用不可

吃逆時：□メトクロプラミド1A静注

□コントミン10mg 1A 筋注

※メトクロプラミド(注射・錠剤)とH2ブロッカー(注射)またはPPI(注射)は原則併用禁忌です。