

## 【レジメン】

day 1,8

⑤ゲムシタピン 1000mg/m<sup>2</sup>

day 1,8

⑦CDDP 25mg/m<sup>2</sup>

day 9~21

休薬

上記を3週毎に繰り返す。

## 【治療内容】

| 実施日            | 投与薬剤   | 経路 | 投薬内容                        | 時間   |
|----------------|--|----|-----------------------------|------|
| day1<br>( / )  | <input type="checkbox"/> ① イメンド125mg 1カプセル                     | 内服 | 吐き気予防薬です。<br>⑦開始60-90分前に内服。 |      |
|                | <input type="checkbox"/> ② 生食500mL                             | 点滴 | 腎障害予防の点滴です。                 | 60分  |
|                | <input type="checkbox"/> ③ デキサート12mg+<br>アロキシバッグ50mL           | 点滴 | 吐き気・過敏症予防の点滴です。             | 15分  |
|                | <input type="checkbox"/> ④ ソリタT3 500mL+<br>硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL | 点滴 | 腎障害予防の点滴です。                 | 60分  |
|                | <input type="checkbox"/> ⑤ ゲムシタピン ( ) mg+<br>生食100mL           | 点滴 | 治療薬です。                      | 30分  |
|                | <input type="checkbox"/> ⑥ 20%マンニトール 300mL                     | 点滴 | 利尿剤です。                      | 30分  |
|                | <input type="checkbox"/> ⑦ CDDP ( ) mg+<br>生食250mL             | 点滴 | 治療薬です。                      | 60分  |
|                | <input type="checkbox"/> ⑧ ソリタT3 1000mL                        | 点滴 | 腎障害予防の点滴です。                 | 120分 |
|                | <input type="checkbox"/> ⑨ フロセミド20mg 1A                        | 静注 | 利尿剤です。                      |      |
| day2<br>( / )  | <input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル                      | 内服 | 吐き気予防薬です。                   | 朝食後  |
| day3<br>( / )  | <input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル                      | 内服 | 吐き気予防薬です。                   | 朝食後  |
| day8<br>( / )  | <input type="checkbox"/> ① イメンド125mg 1カプセル                     | 内服 | 吐き気予防薬です。<br>⑦開始60-90分前に内服。 |      |
|                | <input type="checkbox"/> ② 生食500mL                             | 点滴 | 腎障害予防の点滴です。                 | 60分  |
|                | <input type="checkbox"/> ③ デキサート12mg+<br>アロキシバッグ50mL           | 点滴 | 吐き気・過敏症予防の点滴です。             | 15分  |
|                | <input type="checkbox"/> ④ ソリタT3 500mL+<br>硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL | 点滴 | 腎障害予防の点滴です。                 | 60分  |
|                | <input type="checkbox"/> ⑤ ゲムシタピン ( ) mg+<br>生食100mL           | 点滴 | 治療薬です。                      | 30分  |
|                | <input type="checkbox"/> ⑥ 20%マンニトール 300mL                     | 点滴 | 利尿剤です。                      | 30分  |
|                | <input type="checkbox"/> ⑦ CDDP ( ) mg+<br>生食250mL             | 点滴 | 治療薬です。                      | 60分  |
|                | <input type="checkbox"/> ⑧ ソリタT3 1000mL                        | 点滴 | 腎障害予防の点滴です。                 | 120分 |
|                | <input type="checkbox"/> ⑨ フロセミド20mg 1A                        | 静注 | 利尿剤です。                      |      |
| day9<br>( / )  | <input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル                      | 内服 | 吐き気予防薬です。                   | 朝食後  |
| day10<br>( / ) | <input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル                      | 内服 | 吐き気予防薬です。                   | 朝食後  |
| day15          | 休薬   |    |                             |      |

## 【化学療法施行前に処方する薬剤】

・イメンドセット 2セット

## 【化学療法に関わる指示】

嘔気時：メトクロプラミド ( ) A 静注およびデキサート ( ) mg 静注 ※配合変化のため混合しない  
上記効果が不十分な場合オランザピンOD錠5mg 1錠内服 (1日1回のみ使用可) ※糖尿病の既往がある場合は使用不可吃逆時：メトクロプラミド1A静注コントミン10mg 1A 筋注

※メトクロプラミド (注射・錠剤) とH2ブロッカー (注射) またはPPI (注射) は原則併用禁忌です。