

【レジメン】

day1 ③オキサリプラチン 85mg/m²
 day1 ⑤レボホリナート 200mg/m²
 day1 ⑥CPT-11 150mg/m²
 day1~3 ⑦5-FU 2400mg/m²
 day4~14 休薬

上記を2週毎に繰り返す。

【治療内容】

実施日	投与薬剤	経路	投薬内容	時間
day1 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド125mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。 ③開始60-90分前に内服。	
?	<input type="checkbox"/> ② デキサート6mg+ アロキシバック50mL	点滴	吐き気・過敏症予防の点滴です。	15分
day3 (/)	<input type="checkbox"/> ③ オキサリプラチン() mg+ 5%ブドウ糖液250mL	点滴	治療薬です。	120分
	<input type="checkbox"/> ④ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
	<input type="checkbox"/> ⑤ レボホリナート() mg+ 5%ブドウ糖液250mL	点滴	治療薬です。	④終了後 120分
	<input type="checkbox"/> ⑥ イリフテカン() mg+ 生食500mL	点滴	治療薬です。 ※⑤開始30分後から開始。	④終了後 90分
	<input type="checkbox"/> ⑦ 5-FU() mg+ 生食1000mL	持続点滴	治療薬です。	⑥終了後 46時間
	<input type="checkbox"/> ⑧ 生食50mL	点滴	ルート内をフラッシュします。	15分
day2 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ② デカドロン0.5mg 4錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ③ デカドロン0.5mg 4錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	夕食後
day3 (/)	<input type="checkbox"/> ① イメンド80mg 1カプセル	内服	吐き気予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ② デカドロン0.5mg 4錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	朝食後
	<input type="checkbox"/> ③ デカドロン0.5mg 4錠	内服	吐き気・過敏症予防薬です。	夕食後

【化学療法施行前に処方する薬剤】

- ・イメンドセット 1セット
- ・デカドロン錠0.5mg 8錠/2x朝・夕食後 2日

【化学療法に関わる指示】

嘔気時：□メトクロプラミド() A 静注およびデキサート() mg 静注 ※配合変化のため混合しない
 上記効果が不十分な場合
 □オランザピンOD錠5mg 1錠内服(1日1回のみ使用可) ※糖尿病の既往がある場合は使用不可
 吃逆時：□メトクロプラミド1A静注
 □コントミン10mg 1A 筋注
 ※メトクロプラミド(注射・錠剤)とH2ブロッカー(注射)またはPPI(注射)は原則併用禁忌です。